

Bristolskala for Avføringstyper

MOVICOL®

makrogol 3350 med dektidlytter

Type 1



Separate harde klumper som ligner nøtter

**ØK
MOVICOL®
DOSEN**

Type 2



Pølseformet med klumper

**ØK
MOVICOL®
DOSEN**

Type 3



Ligner en pølse med sprekker på yttersiden

**BEHOLD
MOVICOL®
DOSEN**



Type 4



Ligner en pølse, smidig og myk

**BEHOLD
MOVICOL®
DOSEN**



Type 5



Myke klumper med skarpe kanter (lette å få ut)

**REDUSER
MOVICOL®
DOSEN**

Type 6



Småbiter

**REDUSER
MOVICOL®
DOSEN**

Type 7



Vandig uten klumper
Bare væske

**REDUSER
MOVICOL®
DOSEN**

MOVICOL®

makrogel 3350 med elektrolytter



**NYTT
DESIGN**
– samme
innhold og
smak

MOVICOL® Makrogel 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat og kaliumklorid. Pulver til oppløsning og mikstur oppløsning i dosepose. Til korttidsbehandling av obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Avføringsstopp hvor rektum og/ eller colon er fylt med fast fekalia. Til voksne og barn over 12 år: **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjonell forstyrrelser i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tyntarmen som Crohn's sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megakolon. **Advarsler og forsiktighetsregler:** Det totale væskevolumet av Movicol tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Årsaken til obstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av avføringsmidler er nødvendig. **Bivirkninger:** Abdominalsmarter, diaré, kvalme, abdominal distensjon, borborygmi, flatulens, se også felleskatalogen.no **Interaksjoner:** Det er mulig at absorpsjonen av andre legemidler kan være forbigående redusert på grunn av en reduksjon i den gastrointestinale passasjetiden forårsaket av Movicol. Det har vært isolerte rapporter med redusert effekt av noen samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika. **Graviditet og amning:** Kan brukes av gravide kvinner. Kan brukes under amming. **Dosering:** 1–3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Hver pulver i dosepose skal løses opp i 125 ml vann. Movicol mikstur skal tas rett fra doseposen. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær obstipasjon på grunn av sykdom eller ved legemiddelindusert obstipasjon, eks. opioider eller antimuskarinerge legemidler. Ved avføringsstopp hvor rektum eller colon er fylt med fast fekalia skal den kliniske tilstanden verifiseres ved fysisk undersøkelse av rektum og buken. 8 doseposer oppløst i 1 liter vann bør tas innenfor en periode på 6 timer, per dag i normalt 3 dager. Se også felleskatalogen.no **Pakninger:** Movicol 20 stk, pris ikke fastsatt, reseptgruppe F. 100 stk pris kr 388,10 pr. 15.08.2017, reseptgruppe C, blå resept: ja. Movicol med sjokoladesmak 20 stk pris ikke fastsatt, reseptgruppe F. Movicol mikstur oppløsning i dosepose 10 stk pris ikke fastsatt, reseptgruppe F. **Innehaver av markedsføringstillatelsen:** Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP, Amsterdam, Holland. Basert på SmPC: Movicol 20 stk. 20.11.2018 og Movicol med sjokoladesmak 20 stk. 20.11.2018. Movicol mikstur i dosepose: 20.11.2018 NOR/ MOV/0817/0186. MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.

NOR/MOV/0118/0212 2019-02

NORGINE