

Bristolskala for Avføringstyper

MOVICOL®
makrogol 3350 med elektrolytter

Type 1



Separate harde klumper som ligner nøtter

ØK
MOVICOL®
DOSEN

Type 2



Pølseformet med klumper

ØK
MOVICOL®
DOSEN

Type 3



Ligner en pølse med sprekker på yttersiden

BEHOLD
MOVICOL®
DOSEN



Type 4



Ligner en pølse, smidig og myk

BEHOLD
MOVICOL®
DOSEN



Type 5



Myke klumper med skarpe kanter (lette å få ut)

REDUSER
MOVICOL®
DOSEN

Type 6



Småbiter

REDUSER
MOVICOL®
DOSEN

Type 7



Vandig uten klumper
Bare væske

REDUSER
MOVICOL®
DOSEN



MOVICOL®
makrogol 3350 med elektrolytter

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

MOVICOL® Makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat og kaliumklorid. Pulver til oppløsning, og mikstur, oppløsning i dosepose. Til korttidsbehandling av obstipasjon, behandling av kronisk obstipasjon og til avføringsstopp hvor rektum og/eller colon er fylt med fast avføring. Til voksne og barn over 12 år. **Kontraindikasjoner:** Bruk ikke MOVICOL® ved tarmperforasjon/obstruksjon, tarmslyng, alvorlige betennelsestilstander i tynntarmen, toksisk megakolon og overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. **Advarsler og forsiktighetsregler:** Årsaken til obstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av avføringsmidler er nødvendig. Det totale væskevolumet av MOVICOL® tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. **Vanlige bivirkninger:** Abdominalsmarter, diaré, kvalme, abdominal distensjon, borborygm og flatulens. **Interaksjoner:** Andre legemidler som inntas oralt bør ikke inntas i tidsrommet en time før, i løpet av og en time etter, at man tar MOVICOL® Makrogol 3350 motvirker stivelsens fortykningseffekt, og resulterer dermed i fortykning av preparater som behøver å forbli fortykkede for personer med svelgeproblemer. **Graviditet og amning:** Kan brukes under graviditet og amning. **Dosering:** 1-3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Hver pulver i dosepose skal løses opp i 125 ml vann. MOVICOL® mikstur skal tas rett fra doseposen. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. *Ved avføringsstopp hvor rektum eller colon er fylt med fast avføring:* Den kliniske tilstanden må bekreftes av lege. 8 doseposer per dag. En behandlingsperiode med MOVICOL® ved avføringsstopp vil normalt ikke overstige 3 dager. **Oppbevaringsbetingelser:** Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Alle dosene bør tas innenfor en periode på 6 timer og oppbevares tildekket i kjøleskap (2 °C – 8 °C). **Innehaver av markedsføringstillatelsen:** Norgine Healthcare BV, Antonio Vivaldistraat 150,1083 HP Amsterdam, Holland. **Kontakt:** Norgine Norge AS, Postboks 1935 Vika, 0125 Oslo. Basert på SmPC: MOVICOL® 12.06.2023, MOVICOL® med sjokoladesmak 12.06.2023, MOVICOL® mikstur i dosepose: 12.06.2023. NO-GE-MOV-2300028

NO-GE-MOV-2200027 December 2023



Because patients inspire us

@norgine | www.norgine.com

MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.